

Família Crotalidae: Gênero Bothrops

Pertencem a este grupo a jararaca (*B. jararaca*), urutu (*B. alternatus*), caíçaca (*B. moojeni*), cotiara (*B. cotiara*), jararacuçu (*B. jararacussu*), jararaca-pintada (*B. neuwiedi*) e outras. Possuem fosseta loreal (orifício entre as narinas e olhos), cauda lisa e cabeça triangular. Apresentam cores e desenhos diferentes pelo corpo, variando do verde ao negro. Possuem hábitos diversos, podendo ser encontradas em regiões de matas, entocadas à beira dos rios ou dentro d'água. Seu tamanho pode variar, na vida adulta, de 40cm a 2m de comprimento. A sua peçonha causa reações locais fortes, como a dor, edema, necrose, hemorragia, bem como efeitos sistêmicos como distúrbios da coagulação sangüínea, hemorragia e insuficiência renal aguda.



Bothrops moojeni = caíçaca

Alimentação = roedores, lagartos e anfíbios

Hábito / habitat = noturna / terrícola, vive em áreas mais secas: cerrado

Distribuição geográfica = região oeste de São Paulo e Minas Gerais e região Centro Oeste



Bothrops fonsecai = cotiara, urutu

Alimentação = roedores

Hábito / habitat = noturna / terrícola

Distribuição geográfica = matas da Serra da Mantiqueira



Bothrops jararaca = jararaca

Alimentação = roedores, lagartos e anfíbios

Hábito / habitat = noturna / terrícola, matas

Distribuição geográfica = sul da Bahia até o Rio Grande do Sul



Bothrops jararacussu = jararacuçu

Alimentação = roedores e anfíbios

Hábito / habitat = diurna e noturna / terrícola, matas

Distribuição geográfica = sul da Bahia até o Rio Grande do Sul



Bothrops alternatus = urutu

Alimentação = roedores

Hábito / habitat = noturna / terrícola, campos e cerrados

Distribuição geográfica = São Paulo, Minas Gerais e Região Sul



Bothrops neuwiedi = jararaca pintada

Alimentação = roedores

Hábito / habitat = noturna / terrícola, cerrado e caatinga

Distribuição geográfica = ampla, apresenta diversas subespécies.